

National Early Warning Score (NEWS) 2



Royal College of Physicians
@RCPLondon

Gyvybiniai parametrai	Balai						
	3	2	1	0	1	2	3
Kvėpavimo dažnis (k./min.)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
SpO ₂ 1 (%)*	≤91	92-93	94-95	≥96			
SpO ₂ 2 (%)*	≤83	84-85	86-87	88-92 ≥93 be O ₂	93-94 su O ₂	95-96 su O ₂	≥97 su O ₂
Ar reikalinga deguonies terapija?**		Taip		Ne			
sAKS (mmHg)	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
ŠSD (k./min.)	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
Sąmonės būklė				Budrus***			CVPU***
Temperatūra (°C)	≤35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.0-39.0	≥39.1	

*COVID-19 infekcija sergantiems pacientams nevertinama.

**COVID-19 infekcija sergantiems pacientams žymima, ar pacientui reikalinga deguonies terapija, ar ne.

*** Paciento sąmonės būklė vertinama pagal ACVPU skalę (modifikuotas AVPU skalės variantas), kur: alert (A), confusion (C), voice (V), pain (P), unresponsive (U). Confusion (C) – naujai atsiradęs sumišimas ar bet koks kitas ūmus sąmonės būklės pasikeitimas.

[National Early Warning Score \(NEWS\) 2 | RCP London](#)

Balų suma	Klinikinė rizika	Stebėjimo dažnis	Veiksmai
0	Maža	Bent kas 12 val.	Tęsiama rutininė stebėseną
1-4	Maža	Bent kas 4-6 val.	<ul style="list-style-type: none"> • Informuojamas gydytojas rezidentas, kuris privalo stebėti pacientą • Gydytojas rezidentas nusprendžia, ar reikalinga dažnesnė gyvybinių parametrų stebėseną ir/ar papildomi veiksmai
3 už vieną parametą	Maža-vidutinė	Bent kas 1 val.	<ul style="list-style-type: none"> • Gydytojas rezidentas informuoja atsakingą gydytoją, kuris nusprendžia, ar reikalingi papildomi veiksmai
≥5 Skubus atsakas	Vidutinė	Bent kas 1 val.	<ul style="list-style-type: none"> • Gydytojas rezidentas nedelsiant informuoja atsakingą gydytoją • Atsakingas gydytojas skubiai vertina paciento būklę • Pacientui priežiūra teikiama palatoje, kurioje galima užtikrinti dažną gyvybinių parametrų stebėseną
≥7 Neatidėliotinas atsakas	Didelė	Nuolatinė gyvybinių parametrų stebėseną	<ul style="list-style-type: none"> • Gydytojas rezidentas nedelsiant informuoja atsakingą gydytoją • Paciento būklę įvertinama/aptariama su anesteziologu-reanimatologu • Sprendžiama dėl paciento perkėlimo į ITS

Lentelė **adaptuota** pagal *Royal College of Physicians @RCP London* siūlomas rekomendacijas.
National Early Warning Score (NEWS) 2 | RCP London