

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI**

**Nr. LID2023/8**

2023 rugsėjo 5 d.  
Vilnius

**DĖL COVID-19 VAKCINŲ DERINIMO SU GRIPO IR KITOMIS VAKCINOMIS**

Dėl COVID-19 ligos profilaktikos rekomenduojama laikytis tarptautinių Amerikos ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC), Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) rekomendacijų ir skiepimą nuo COVID-19 derinti su skiepimu nuo gripo, skiepijant gyventojus tą pačią dieną į skirtingas kūno vietas. Jei dėl logistinių ar administracinių priežasčių gyventojai negali būti skiepijami vieno vizito asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPI) metu, tokiu atveju intervalas tarp COVID-19 ir gripo vakcinų gali būti pasirinktas pagal ASPI patogumą (pavyzdžiui, viena, dvi dienos ar kt.).

Remiantis bendraisiais imunoprofilaktikos principais, nėra įrodymų, kad negyvos vakcinos paveiktų kitų negyvų ar gyvų vakcinų sukeliama imuninį atsaką. Bet kuri negyva vakcina gali būti skiriama tuo pačiu metu ar bet kuriuo intervalu su skirtingomis negyvomis ar gyvomis vakcinomis.

CDC duomenimis, per visą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos laikotarpį atlikti tyrimai rodo, kad saugu skiepytis ir gripo, ir COVID-19 vakcina to paties vizito metu. 2022 metais paskelbto CDC tyrimo duomenimis, žmonės, kurie tuo pačiu metu pasiskiepijo gripo vakcina ir papildoma COVID-19 iRNR vakcinos doze, šiek tiek dažniau (8-11 proc.) patyrė tokių reakcijų, kaip nuovargis, galvos ir raumenų skausmas, nei tie, kurie pasiskiepijo tik COVID-19 iRNR vakcinos papildoma doze (šios reakcijos dažniausiai buvo lengvos ir greitai išnyko). Šio tyrimo rezultatai atitinka klinikinių tyrimų duomenis, kuriuose nenustatyta jokių saugumo iššūkių dėl abiejų vakcinų skyrimo vienu metu. Daugiau informacijos: <https://www.cdc.gov/flu/prevent/coadministration.htm>

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras rekomenduoja rudens/žiemos vakcinacijos kampanijų metu šalims apsvarstyti galimybę rengti bendras vakcinacijos nuo COVID-19 ir gripo kampanijas, nes toks metodas gali būti veiksmingesnis administravimo, logistikos ir išlaidų požiūriu. Naujausios ECDC rekomendacijos dėl COVID-19 vakcinacijos: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-interim-public-health-considerations-vaccination-2023.pdf>

Lietuvos mokslų akademija yra pasidalinusi prof. Vytauto Usonio išaiškinimu dėl intervalų tarp COVID-19 ir kitų vakcinų skiepimo. Visos šiuo metu registruotos COVID-19 vakcinos yra negyvosios. Net vakcinos, kurių veiklioji medžiaga susieta su modifikuotais adenovirusais, paskiepytųjų organizme nesidaugina, todėl skiepimo ir intervalų tarp

skiepijamų vakcinų prasme jos traktuojamos kaip negyvosios. Naujausios rekomendacijos nurodo, kad COVID-19 ir kitos vakcinos gali būti skiepijamos nesilaikant jokių intervalų tarp šių vakcinų skiepijimo. COVID-19 vakcina gali būti skiepijama tą pačią dieną su kitomis vakcinomis, arba bet kuriuo kitu metu iki arba po kitų vakcinų skiepijimo. Šiuo metu nėra patikimų duomenų apie tai, ar tą pačią dieną skiepijamos COVID-19 kartu su kitomis vakcinomis didina nepageidaujamų povakcininių reiškinių dažnį ar sunkumą. Daugiau informacijos: <https://www.lma.lt/uploads/COVIN-19/2021-06-12%20Intervalai.pdf>

Parengė Lietuvos infektologų draugijos valdybos narė prof. Ligita Jančorienė

Lietuvos infektologų draugijos pirmininkė



dr. Danguolė Važnaisienė

